

# Avertissements agricoles

DLP 29-5-84369844

PUBLICATION PERIODIQUE  
ABONNEMENT ANNUEL

Régisseur de Recettes de la DDA  
C.C.P. Montpellier 5238-57

Bulletin n° 8 du 23/05/1984

## AVERTISSEMENT DESTINE AUX AGRICULTEURS DU LAURAGAIS

(rédigé en collaboration avec la ferme de Loudes,  
les G.V.A., les C.I.V.A.M.  
et les coopératives)

### CEREALES

Sur blé tendre et plus particulièrement blé dur, la SEPTORIOSE, l'OIDIUM  
et la ROUILLE BRUNE sont à des niveaux préoccupants dans de nombreuses situations.

Compte tenu du stade, et des conditions climatiques présentes, la protection  
de ces cultures est impérative et doit-être réalisée le plus rapidement possible,  
pour être techniquement et économiquement valable.

Observez vos champs et traitez si vous pouvez observer SEPTORIOSE, OIDIUM et  
ROUILLE BRUNE sur les étages foliaires supérieurs.

L'OIDIUM seul commençant à apparaître sur les épis, doit-être traité même en  
l'absence de rouille.

Une décision rapide s'impose pour appliquer un traitement;

- Utilisez : TILT C ..... 1 litre/Ha  
VIGIL T ..... 2,5 l/Ha  
CORVET CM ..... 4 Kgs/Ha

PUCERONS : présent sur de très nombreuses parcelles.

Traitez impérativement si un épis sur deux porte des pucerons.

Utilisez PIRIMOR-G à 0,250 Kgs/Ha. Vous pouvez mélanger cette spé-  
cialité à l'un des fongicides préconisés.

POIS PROTEAGINEUX : BOTRYTIS et PUCERONS présents sur la quasi totalité des par-  
celles de pois.

.../...

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

EDITION DE LA STATION LANGUEDOC - ROUSSILLON

Maison de l'Agriculture - Bâtiment 5, Place Chaptal

34076 MONTPELLIER CEDEX - Tél. (67) 92.41.42

Imprimerie de la Station d'Avertissements Agricoles

Le Directeur, M. FREYDIER

N° d'inscription 531 AD



P52

Traitez à réception du présent avis avec :

PELTAR à 3,5 Kgs/Ha

PIRIMOR G à 0,5 Kgs/Ha

SESAMIE DU MAIS : Nous observons le tout début du vol, ce ravageur est actuellement contrarié par des conditions climatiques qui lui sont défavorables.

Cependant, dans les situations les plus précoces, traitez avec DIMILIN à raison de 0,5 Kgs/Ha, dès le stade 3-4 feuilles du Maïs.

Tirage du 23 Mai 1984 - 1500 exemplaires.

(c) Bulletin technique des avertissements agricoles - MONTPELLIER 1984.

CEREALES



MINISTRE DE L'AGRICULTURE  
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX  
DIRECTION DE LA SANTE ANIMALE  
10, rue de la République - 34000 Montpellier  
Tél. 04 67 31 41 41